

SUPPLÉMENT 2015

Guide de protection des légumes de serre 2014-2015

Publication 835SF — Juin 2015

Tous les produits homologués pour la protection des légumes de serre jusqu'en juillet 2014 figurent dans la plus récente édition de la Publication 835F, *Guide de protection des légumes de serre 2014-2015*. Le présent supplément contient de nouveaux renseignements sur les produits de protection des cultures ainsi que les modifications apportées aux étiquettes entre juillet 2014 et juin 2015. On peut télécharger les éditions complètes de la Publication 835F et du supplément 2015 à partir du site Web du MAAARO à www.ontario.ca/culturesdeserre.

On trouvera sur le site Web de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), à www.santecanada.gc.ca/arla, des renseignements sur les limites maximales de résidus (LMR), et sous l'onglet Recherche d'étiquettes, les étiquettes de tous les produits homologués.

MODIFICATIONS OU CORRECTIONS CONCERNANT LES PRODUITS

Tableau	Culture	Produit à modifier	Ravageur ou maladie	Modification
4-2	tomate	Nova 40 W (WSP)	oïdium (blanc)	1 application par cycle cultural
5-2	concombre	Nova 40 W (WSP)	chancre gommeux	1 application par cycle cultural
		Nova 40 W (WSP)	oïdium (blanc)	1 application par cycle cultural
6-2	poivron	Nova 40 W (WSP)	oïdium (blanc)	1 application par cycle cultural

AJOUTS ET NOUVELLES UTILISATIONS

Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate — Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Ravageurs	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
pucerons	Bio-Ceres G WP/WG	<i>Beauveria bassiana</i> , souche ANT-03	2–4 g/L	—	0	Commencer les traitements dès l'apparition des premiers insectes nuisibles. Les applications hâtives sont plus efficaces avant que les populations soient trop élevées. Il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs applications. Répéter le traitement dans les 7 jours, ou 3 à 5 jours plus tard si les populations sont élevées. Ne pas mélanger avec un fongicide. Peut être entreposé jusqu'à 12 mois à 4 °C, jusqu'à 6 mois à 21 °C si le contenant n'a pas été ouvert et jusqu'à 3 mois à 21 °C si le contenant a été ouvert.
	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Dissuade les insectes de s'alimenter. Appliquer dès l'apparition de l'insecte. Effectuer les traitements à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
fausse- arpenreuse du chou	Delegate WG	spinétorame	92–132 g/1000 L	—	2	Appliquer au moment où les œufs éclosent et que les larves du premier instar sont présentes. Intervalle minimum de 7 jours entre les applications et maximum de 3 applications par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.

Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate — Ajouts (suite)

LÉGENDE : DF = poudre fluide EC = concentré émulsifiable F = pâte fluide SC = concentré pulvérisable W, WP = poudre mouillable WG = granulés mouillables WSP = sacs hydrosolubles — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Ravageurs	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
thrips	Bio-Ceres G WP/WG	<i>Beauveria bassiana</i> , souche ANT-03	2–4 g/L	—	0	Commencer les traitements dès l'apparition des insectes nuisibles. Les applications hâtives sont plus efficaces avant que les populations soient trop élevées. Il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs applications. Répéter le traitement dans les 7 jours, ou 3 à 5 jours plus tard si les populations sont élevées. Ne pas mélanger avec un fongicide. Peut être entreposé jusqu'à 12 mois à 4 °C, jusqu'à 6 mois à 21 °C si le contenant n'a pas été ouvert et jusqu'à 3 mois à 21 °C si le contenant a été ouvert.
	Delegate WG	spinétorame	92–132 g/1000 L	—	2	Pour une maîtrise partielle des thrips des petits fruits visibles. Appliquer dès l'apparition de l'insecte. Intervalle minimum de 7 jours entre les applications et maximum de 3 applications par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
tétranyque à deux points	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.

Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate — Ajouts (suite)

LÉGENDE : DF = poudre fluide EC = concentré émulsifiable F = pâte fluide SC = concentré pulvérisable W, WP = poudre mouillable WG = granulés mouillables WSP = sacs hydrosolubles — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Ravageurs	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
aleurodes	Bio-Ceres G WP/WG	<i>Beauveria bassiana</i> , souche ANT-03	2–4 g/L	—	0	Commencer les traitements dès l'apparition des insectes nuisibles. Les applications hâtives sont plus efficaces avant que les populations soient trop élevées. Il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs applications. Répéter le traitement dans les 7 jours, ou 3 à 5 jours plus tard si les populations sont élevées. Ne pas mélanger avec un fongicide. Peut être entreposé jusqu'à 12 mois à 4 °C, jusqu'à 6 mois à 21 °C si le contenant n'a pas été ouvert et jusqu'à 3 mois à 21 °C si le contenant a été ouvert.
	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Dissuade les insectes de s'alimenter. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.

Tableau 4–2. Produits homologués contre les maladies de la tomate — Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Maladie	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
fonte des semis	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
<i>Fusarium</i> spp.	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
<i>Fusarium oxysporum</i>	Trianum P & G	<i>Trichoderma harzianum</i> Rifai, souche T22	Au semis : 1,5 g/m ² de surface cultivée, en suspension dans 2,5–5 L d'eau	—	—	Appliquer par bassinage ou par pulvérisation au semis. Au semis : appliquer la solution immédiatement après les semis.
			Culture à densité élevée : 3 g/m ² , volume d'eau équivalent à 10 % de volume de substrat, ou 2–5 L/m ²	—	—	Culture à densité élevée : appliquer la moitié de la dose (1,5 g/m ²) pour les traitements subséquents. Effectuer un traitement de rappel à la moitié de la dose toutes les 10 semaines.
			Culture à faible densité : 30 g/1000 plants, volume d'eau équivalent à 10 % de volume de substrat, ou 100 L/1000 plants	—	—	Culture à faible densité : appliquer la moitié de la dose (15 g/1000 plants) pour les traitements subséquents. Effectuer un traitement de rappel à la moitié de la dose toutes les 10 semaines. Conserver dans un endroit sec entre 8 °C–10 °C. Utiliser dans les 6 mois qui suivent la date de fabrication.

Tableau 4–2. Produits homologués contre les maladies de la tomate — Ajouts (suite)

LÉGENDE : DF = poudre fluide EC = concentré émulsifiable F = pâte fluide SC = concentré pulvérisable W, WP = poudre mouillable WG = granulés mouillables WSP = sacs hydrosolubles — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Maladie	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
oïdium (blanc) (<i>Leveillula taurica</i>)	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Commencer les traitements quand les conditions sont propices au développement de la maladie ou dès l'apparition des premiers symptômes. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
oïdium (blanc) (<i>Oidium neolycopersici</i> et <i>Leveillula taurica</i>)	Regalia Maxx	extrait de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	0,5–1 L/400 L	Ne pas pénétrer dans les zones traitées avant que le produit pulvérisé n'ait séché.	0	Pour une maîtrise partielle du mildiou. Commencer les traitements dès les premiers signes de la maladie, ou quand les conditions sont propices à son développement. Répéter au besoin à intervalles de 7 à 10 jours. Ne pas appliquer avec un volume de bouillie de plus de 1500 L/ha.
pourriture pythienne	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
<i>Rhizoctonia solani</i>	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle seulement. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.

Tableau 5-1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre— Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Ravageurs	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
pucerons	Bio-Ceres G WP/WG	<i>Beauveria bassiana</i> , souche ANT-03	2–4 g/L	—	0	Commencer les traitements dès l'apparition des insectes nuisibles. Les applications hâtives sont plus efficaces avant que les populations soient trop élevées. Il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs applications. Répéter le traitement dans les 7 jours, ou 3 à 5 jours plus tard si les populations sont élevées. Ne pas mélanger avec un fongicide. Peut être entreposé jusqu'à 12 mois à 4 °C, jusqu'à 6 mois à 21 °C si le contenant n'a pas été ouvert et jusqu'à 3 mois à 21 °C si le contenant a été ouvert.
	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Dissuade les insectes de s'alimenter. Commencer les traitements dès l'apparition des insectes. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
fausse- arpen- teuse du chou	Delegate WG	spinétorame	92–132 g/1000 L	—	2	Appliquer à l'éclosion des œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s'écouler au moins 7 jours entre chacune. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
thrips	Bio-Ceres G WP/WG	<i>Beauveria bassiana</i> , souche ANT-03	2–4 g/L	—	0	Commencer les traitements dès l'apparition des insectes nuisibles. Les applications hâtives sont plus efficaces avant que les populations soient trop élevées. Il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs applications. Répéter le traitement dans les 7 jours, ou 3 à 5 jours plus tard si les populations sont élevées. Ne pas mélanger avec un fongicide. Peut être entreposé jusqu'à 12 mois à 4 °C, jusqu'à 6 mois à 21 °C si le contenant n'a pas été ouvert et jusqu'à 3 mois à 21 °C si le contenant a été ouvert.
	Delegate WG	spinétorame	92–132 g/1000 L	—	2	Pour une maîtrise partielle des thrips des petits fruits visibles. Appliquer dès l'apparition de l'insecte. Laisser un minimum de 7 jours entre les applications et ne pas appliquer plus de 3 fois par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.

Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre— Ajouts (suite)

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Ravageurs	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
tétranyque à deux points	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
aleurodes	Bio-Ceres G WP/WG	<i>Beauveria bassiana</i> , souche ANT-03	2–4 g/L	—	0	Commencer les traitements dès l'apparition des insectes nuisibles. Les applications hâtives sont plus efficaces avant que les populations soient trop élevées. Il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs applications. Répéter le traitement dans les 7 jours, ou 3 à 5 jours plus tard si les populations sont élevées. Ne pas mélanger avec un fongicide. Peut être entreposé jusqu'à 12 mois à 4 °C, jusqu'à 6 mois à 21 °C si le contenant n'a pas été ouvert et jusqu'à 3 mois à 21 °C si le contenant a été ouvert.
	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Dissuade les insectes de s'alimenter. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.

Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre — Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Maladie	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
fonte des semis	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
fonte des semis (<i>Pythium ultimum</i>)	Trianum P & G	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Rifai</i> , souche T22	Au semis : 1,5 g/m ² de surface cultivée, en suspension dans 2,5–5 L d'eau	—	—	Appliquer par bassinage ou par pulvérisation au semis. Au semis : appliquer la solution immédiatement après les semis.
			Culture à densité élevée : 3 g/m ² , volume d'eau équivalent à 10 % de volume de substrat, ou 2–5 L/m ²	—	—	Culture à densité élevée : appliquer la moitié de la dose (1,5 g/m ²) pour les traitements subséquents. Effectuer un traitement de rappel à la moitié de la dose toutes les 10 semaines.
			Culture à faible densité : 30 g/1000 plants, volume d'eau équivalent à 10 % de volume de substrat, ou 100 L/1000 plants	—	—	Culture à faible densité : appliquer la moitié de la dose (15 g/1000 plants) pour les traitements subséquents. Effectuer un traitement de rappel à la moitié de la dose toutes les 10 semaines. Conserver dans un endroit sec entre 8 °C–10 °C. Utiliser dans les 6 mois qui suivent la date de fabrication.
mildiou (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Regalia Maxx	extrait de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	1 L/400 L	Ne pas pénétrer dans les zones traitées avant que le produit pulvérisé n'ait séché.	0	Maîtrise partielle. Commencer les traitements dès les premiers signes de la maladie, ou quand les conditions sont propices à son développement. Répéter au besoin à intervalles de 7 à 10 jours. Ne pas appliquer avec un volume de bouillie de plus de 1500 L/ha.

Tableau 5-2. Produits homologués contre les maladies du concombre — Ajouts (suite)

LÉGENDE :							
DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable		EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables		F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles		SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette	
Maladie	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques	
<i>Fusarium</i> spp.	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.	
oïdium (blanc) (<i>Podosphaera xanthii</i> , auparavant <i>Spaerotheca fuliginea</i>)	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Commencer les traitements quand les conditions sont propices au développement de la maladie ou dès l'apparition des premiers symptômes. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.	
pourriture pythienne	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.	
<i>Rhizoctonia solani</i>	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle seulement. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.	

Tableau 6-1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron — Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Ravageurs	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
pucerons	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Dissuade les insectes de s'alimenter. Commencer les traitements dès l'apparition des insectes. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
fausse- arpen-teuse du chou	Delegate WG	spinétorame	92-132 g/1000 L	—	2	Appliquer à l'éclosion des œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. Laisser un minimum de 7 jours entre les applications et ne pas appliquer plus de 3 fois par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
pyrale du maïs	Delegate WG	spinétorame	92-132 g/1000 L	—	2	Appliquer à l'éclosion des œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. Intervalle minimum de 7 jours entre les applications et maximum de 3 applications par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
thrips	Delegate WG	spinétorame	92-132 g/1000 L	—	2	Pour une maîtrise partielle des thrips des petits fruits visibles. Appliquer dès l'apparition de l'insecte. Laisser un minimum de 7 jours entre les applications et ne pas appliquer plus de 3 fois par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
tétranyque à deux points	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
aleurodes	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Dissuade les insectes de s'alimenter. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.

Tableau 6–2. Produits homologués contre les maladies du poivron — Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Maladie	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
fonte des semis	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
<i>Fusarium</i> spp.	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
oïdium (blanc) (<i>Leveillula</i> <i>taurica</i>)	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Commencer les traitements quand les conditions sont propices au développement de la maladie ou dès l'apparition des premiers symptômes. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
oïdium (blanc) (<i>Oidium</i> <i>neolycopersici</i> et <i>Leveillula</i> <i>taurica</i>)	Regalia Maxx	extrait de <i>Reynoutria</i> <i>sachalinensis</i>	0,5–1 L/400 L	Ne pas pénétrer dans les zones traitées avant que le produit pulvérisé n'ait séché.	0	Maîtrise partielle. Commencer les traitements dès les premiers signes de la maladie ou quand les conditions sont propices à son développement. Répéter au besoin à intervalles de 7 à 10 jours. Ne pas appliquer avec un volume de bouillie de plus de 1500 L/ha.
pourriture pythienne	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
<i>Rhizoctonia</i> <i>solani</i>	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.

Tableau 7-1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la laitue — Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Ravageurs	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
fausse- arpenreuse du chou	Delegate WG	spinétorame	92-132 g/1000 L	—	2	Appliquer à l'éclosion des œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. Intervalle minimum de 7 jours entre les applications et maximum de 3 applications par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.

Tableau 7-2. Produits homologués contre les maladies de la laitue— Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F =pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Maladie	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
fonte des semis (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Trianum P & G	<i>Trichoderma harzianum</i> Rifai, souche T22	Au semis : 1,5 g/m ² de surface cultivée, en suspension dans 2,5-5 L d'eau	—	—	Appliquer par bassinage ou par pulvérisation au semis. Au semis : appliquer la solution immédiatement après les semis.
			Culture à densité élevée : 3 g/m ² , volume d'eau équivalent à 10 % de volume de substrat, ou 2-5 L/m ²	—	—	Culture à densité élevée : appliquer la moitié de la dose (1,5 g/m ²) pour les traitements subséquents. Effectuer un traitement de rappel à la moitié de la dose toutes les 10 semaines.
			Culture à faible densité : 30 g/1000 plants, volume d'eau équivalent à 10 % de volume de substrat, or 100 L/1000 plants	—	—	Culture à faible densité : appliquer la moitié de la dose (15 g /1000 plants) pour les traitements subséquents. Effectuer un traitement de rappel à la moitié de la dose toutes les 10 semaines. Conserver dans un endroit sec entre 8 °C-10 °C. Utiliser dans les 6 mois qui suivent la date de fabrication.

Tableau 8–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de l'aubergine — Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Ravageurs	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
pucerons	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Dissuade les insectes de s'alimenter. Commencer les traitements dès l'apparition des insectes. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
fausse- arpen-teuse du chou	Delegate WG	spinétorame	92–132 g/1000 L	—	2	Appliquer à l'éclosion des œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. Laisser un minimum de 7 jours entre les applications et ne pas appliquer plus de 3 fois par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
pyrale du maïs	Delegate WG	spinétorame	92–132 g/1000 L	—	2	Appliquer à l'éclosion des œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. Laisser un minimum de 7 jours entre les applications et ne pas appliquer plus de 3 fois par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
thrips	Delegate WG	spinétorame	92–132 g/1000 L	—	2	Pour une maîtrise partielle des thrips des petits fruits visibles. Appliquer dès l'apparition de l'insecte. Intervalle minimum de 7 jours entre les applications et maximum de 3 applications par cycle cultural. N'utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit.
	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle seulement. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
tétranyque à deux points	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
aleurodes	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Dissuade les insectes de s'alimenter. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.

Tableau 8–2. Produits homologués contre les maladies de l'aubergine — Ajouts

LÉGENDE : DF = poudre fluide W, WP = poudre mouillable EC = concentré émulsifiable WG = granulés mouillables F = pâte fluide WSP = sacs hydrosolubles SC = concentré pulvérisable — = aucune information fournie sur l'étiquette						
Disease	Nom commercial/ Formulation	Nom commun ou matière active	Dose	Délai de sécurité après traitement (en heures)	Délai d'attente avant récolte (en jours)	Remarques
fonte des semis	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
<i>Fusarium</i> spp.	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle seulement. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
oïdium (blanc)	Purespray Green huile de pulvérisation 13E	huile minérale	10 L/1000 L	—	—	Maîtrise partielle. Commencer les traitements quand les conditions sont propices au développement de la maladie ou dès l'apparition des premiers symptômes. Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours. Limiter la première application à une petite section de chaque variété pour vérifier la tolérance. Un recouvrement complet est nécessaire pour assurer une maîtrise efficace. Éviter les pulvérisations excessives.
pourriture pythienne	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.
<i>Rhizoctonia</i> <i>solani</i>	Serifel	<i>Bacillus subtilis</i> , souche MBI 600	50 g/12,5 L	—	—	Maîtrise partielle. Arroser sur 21,9 m ³ de milieu de culture (terreau d'empotage, mousse de tourbe ou mélanges à base de tourbe). Mélanger complètement afin d'assurer une distribution adéquate du produit. Conserver dans un endroit sec jusqu'à 16 mois après la date de fabrication.



Publié par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, Toronto, 2015

ISSN 1923-6301

Also available in English.