




Accueil Conditions d'utilisation À propos Élevages Cultures Ressources Certifié biologique English Version

← Cours gratuits sur l'agroalimentaire pour développer votre entreprise

Choix du moment de la sortie du printemps

Publié le 25 mai 2019 par Betty Summerhayes, OMAFRA, Technology Transfer Specialist

Choix du moment de la sortie du printemps

Le printemps est dans l'air, et les bovins comme les fermiers sont anxieux de commencer la saison du pâturage. Le choix propice de cet agréable moment est essentiel, car la gestion du pâturage printanier établit à la fois le rendement des prés et la quantité des gains réalisables pour les veaux et les animaux d'un an.

Quand tôt est trop tôt?

Le bétail devrait sortir dans les pâturages lorsque les plantes ont développées trois ou quatre nouvelles feuilles d'herbe. Une sortie plus rapide est très stressante pour les plantes. Les fourrages vivaces dépendent des carbohydrates emmagasinés dans leurs racines pour alimenter la repousse lorsqu'ils sortent de leur dormance (figure 1). Les plantes ne réapprovisionnent pas ces dépôts de carbohydrates tant qu'elles n'ont pas des feuilles dont la surface est suffisante pour produire plus de sucre que ce dont elles ont besoin pour pousser. Si l'on attend que les herbes aient trois ou quatre nouvelles feuilles complètement développées, les plantes ont la possibilité de réintroduire de l'énergie dans leurs racines. Les plantes puiseront à nouveau dans ces réserves pour se rétablir après le pâturage. Si le bétail sort dans les pâtures trop tôt, les plantes n'ont pas la capacité de

Confidentialité & Cookies : Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir davantage, y compris comment contrôler les cookies, voir : [Politique relative aux cookies](#)

les rendements des pâtures pendant le reste de la saison de pâturage. Si le bétail sort trop tôt année après année, des mauvaises herbes qui commencent à pousser après l'herbe au printemps seront peut-être capables de supplanter les plantes fourragères.

[Pour en savoir plus](#)

Suivre onagrobio 1

Archives

- mai 2019
- avril 2018
- juin 2017
- mai 2017
- mars 2017
- décembre 2016
- novembre 2016
- octobre 2016
- juillet 2016
- juin 2016
- avril 2016
- mars 2016
- février 2016
- janvier 2016
- décembre 2015
- novembre 2015
- octobre 2015
- septembre 2015
- août 2015
- juillet 2015

Publicités

Publicités

Partager :

☐ Twitter

☐ Facebook

J'aime

Soyez le premier à aimer cet article.

Sur le même thème

[Les nombreux avantages de l'utilisation des brise-vent](#)
Dans "Non classé"

[Voulez-vous augmenter les rendements de vos cultures de 10 à 15 %? Plantez un brise-vent!](#)
Dans "Cultures"

[Avez-VOUS pensé à planter un brise-vent?](#)
Dans "Non classé"



A propos Betty Summerhayes, OMAFRA, Technology Transfer Specialist
Technology Transfer Specialist, OMAFRA
[Afficher tous les articles de Betty Summerhayes, OMAFRA, Technology Transfer Specialist →](#)

Cet article a été publié dans [Non classé](#). Ajoutez [ce permalien](#) à vos favoris.

← Cours gratuits sur l'agroalimentaire pour développer votre entreprise

Répondre